

2019年6月26日

各位

会社名 あゆみ製薬株式会社
代表者 代表取締役社長 大内 光
問合せ先 経営企画室 大淵 亮
(TEL 03 - 6264 - 3525)

メトレート®錠 2mg「効能又は効果」「用法及び用量」の追加承認取得のお知らせ

あゆみ製薬株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 大内光)は、本日、メトレート®錠 2mg につきまして、下記の通り「効能又は効果」および「用法及び用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

これにより、先発品との適応不一致が解消され、先発品と同様に使用していただけるようになりました。

記

1. 効能又は効果(下線部が追加となります)

関節リウマチ

局所療法で効果不十分な尋常性乾癬関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症

関節症状を伴う若年性特発性関節炎

2. 用法及び用量(下線部が追加となります)

関節リウマチ

局所療法で効果不十分な尋常性乾癬関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症

通常、1週間単位の投与量をメトレキサートとして6mgとし、1週間単位の投与量を1回又は2~3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。

なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが、1週間単位の投与量として16mgを超えないようにする。

関節症状を伴う若年性特発性関節炎

通常、1週間単位の投与量をメトレキサートとして4~10mg/m²とし、1週間単位の投与量を1回又は2~3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。

なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減する。

以上